

≪その他診療科≫術前に休薬を考慮すべき内服薬

	一般名	代表的な商品名	休薬期間
抗凝固薬	リバーロキサバン	イグザレルト	1日前
	エドキサバン	リクシアナ	1日前
	アピキサバン	エリキュース	2日前
	ダビガトラン	プラザキサ	2日前
	ワルファリン	ワーファリン	5日前
抗血小板薬	アスピリン	バイアスピリン/バファリンA81	7日前
	アスピリン/ランソプラゾール	タケルダ	7日前
	アスピリン/ボノプラザン (タケキャブ)	キャブピリン	7日前
	クロピドグレル	プラビックス	14日前
	アスピリン/クロピドグレル	コンプラビン	14日前
	プラスグレル	エフィエント	14日前
	チクロピジン	パナルジン	14日前
	チカグレロル	ブリリント	5日前
	シロスタゾール	プレタール	3日前
	イコサペント酸エチル	エバデール	7日前
	オメガ-3脂肪酸エチル	ロトリガ	7日前
	サルボグレラート	アンブラーグ	1日前
	ベラプロスト	ドルナー/プロサイリン/ベラサスLA/ ケアロードLA	1日前
血管拡張薬	リマプロストアルファデクス	オバルモン/プロレナール	1日前
	ジラゼブ	コメリアン	2日前
	トラピジル	ロコルナール	2日前
	ジピリダモール	ベルサンチン/ベルサンチンL	2日前
脳循環改善薬	イフェンプロジル	セロクラール	2日前
	イブジラスト	ケタス	2日前
	ニセルゴリン	サアミオン	2日前
経口血糖降下薬	ビグアナイド薬	メトホルミン/メトグルコ/グリコラン/配合剤/ ジベトス/ジベトン	2日前
	SGLT2阻害薬	スーグラ/フォシーガ/ルセフィ/アプルウェイ/ デベルザ/カナグル/ジャディアンス/配合剤	最低3日前
	それ以外		糖尿病内科の指示に従う
骨粗鬆症薬 <sup>※1</sup>	ラロキシフェン	エビスタ	3日前
	バゼドキシフェン	ビビアント	
女性ホルモン系薬 <sup>※1</sup>	エチニルエストラジオール・ドロスピレノン	ヤーズ/ヤーズフレックス	術前4週～術後2週
	エチニルエストラジオール・レボノルゲストレル	ジェミニーナ	
	エチニルエストラジオール・ノルエチステロン	ルナベル/シンフェーズ/フリウェル	
	低用量ピル	アンジュ/トリキュラー/ラベルフィーユ	術前4週～術後2週
		マーベロン/ファボワール	
	エチニルエストラジオール・ノルゲストレル	プラノバル	術前4週 (医師の指示確認)
	結合エストロゲン	プレマリン	術前4週 (医師の指示確認)
メドロキシプロゲステロン	ヒスロンH	術前4週間～術後1週 (医師の指示確認)	

休薬期間は手術日を含まない日数になります

記載のある休薬期間はあくまで目安です。主治医の指示がある場合はこの限りではありません

手術当日の内服指示は必ず主治医に確認をお願いします

2022年3月更新 信州上田医療センター薬剤部