

**≪歯科≫検査・術前に休薬を考慮すべき内服薬**

	一般名	代表的な商品名	抜歯以外の全身麻酔手術 休薬期間	抜歯（全身麻酔） ・局所麻酔手術 休薬期間
抗凝固薬	リバーロキサバン	イクザレルト	1日前	休薬なし
	エドキサバン	リクシアナ	1日前	
	アビキサバン	エリキウス	2日前	
	ダビガトラン	ブラザキサ	2日前	
	ワルファリン	ワーファリン	5日前	
抗血小板薬	アスピリン	バイアスピリン/パファリンA81	7日前	休薬なし
	アスピリン/ランソプラゾール	タケルダ	7日前	
	アスピリン/ボノプラザン（タケキャブ）	キャブピリン	7日前	
	クロピドグレル	プラビックス	14日前	
	アスピリン/クロピドグレル	コンプラビン	14日前	
	プラスグレル	エフィエント	14日前	
	チクロピジン	パナルジン	14日前	
	チカグレロル	ブリリント	5日前	
	シロスタゾール	プレタール	3日前	
	イコサペント酸エチル	エバデル	7日前	
	オメガ-3脂肪酸エチル	ロトリガ	7日前	
	サルボグレラート	アンブラーグ	1日前	
	ペラプロスト	ドルナー/プロサイリン/ペラサスLA/ ケアロードLA	1日前	
血管拡張薬	リマプロストアルファデクス	オバルモン/プロレナール	1日前	休薬なし
	ジラゼブ	コメリアン	2日前	
	トラピジル	ロコルナール	2日前	
	ジビリダモール	ベルサンチン/ベルサンチンL	2日前	
脳循環改善薬	イフェンプロジル	セロクラール	2日前	休薬なし
	イブジラスト	ケタス	2日前	
	ニセルゴリン	サアミオン	2日前	
経口血糖降下薬	ビグアナイド薬	メトホルミン/メトグルコ/グリコラン/配合剤/ジベトス/ ジベトン	2日前	休薬なし
	SGLT2阻害薬	スーグラ/フォシーガ/ルセフィ/アブルウェイ/デベルザ/ カナグル/ジャディアンス/配合剤	最低3日前	
	それ以外		糖尿病内科の指示に従う	
骨粗鬆症薬 <sup>*1</sup>	ラロキシフェン	エビスタ	3日前	休薬なし
	パゼドキシフェン	ビビアント		
女性ホルモン系薬 <sup>*1</sup>	エチニルエストラジオール・ドロスピレノン	ヤーズ/ヤーズフレックス	術前4週～術後2週	休薬なし
	エチニルエストラジオール・レボノルゲストレル	ジェミニーナ		
	エチニルエストラジオール・ノルエチステロン	ルナベル/シンフェーズ/フリウェル		
	低用量ピル	アンジュ/トリキュラー/ラベルフィーユ	術前4週～術後2週	
		マーベロン/ファボワール		
	エチニルエストラジオール・ノルゲストレル	ブラノバル	術前4週（医師の指示確認）	
	結合エストロゲン	プレマリン	術前4週（医師の指示確認）	
メドロキシプロゲステロン	ヒスロンH	術前4週間～術後1週 （医師の指示確認）		

休薬期間は手術日を含まない日数になります

記載のある休薬期間はあくまで目安です。主治医の指示がある場合はこの限りではありません

手術当日の内服指示は必ず主治医に確認をお願いします

2022年3月作成 信州上田医療センター薬剤部 歯科口腔外科