

≪腎臓内科≫検査・術前に休薬を考慮すべき内服薬

	一般名	代表的な商品名	腎生検 休薬期間	シャント作成 休薬期間
抗凝固薬	リバーロキサバン	イグザレルト	1日前	休薬なし
	エドキサバン	リクシアナ	1日前	
	アピキサバン	エリキュース	2日前	
	ダビガトラン	プラザキサ	2日前	
	ワルファリン	ワーファリン	5日前	
抗血小板薬	アスピリン	バイアスピリン/バファリンA81	7日前	休薬なし
	アスピリン/ランソプラゾール	タケルダ	7日前	
	アスピリン/ポノプラザン (タケキャブ)	キャブピリン	7日前	
	クロピドグレル	プラビックス	14日前	
	アスピリン/クロピドグレル	コンプラビン	14日前	
	プラスグレル	エフィエント	14日前	
	チクロピジン	パナルジン	14日前	
	チカグレロル	ブリリント	5日前	
	シロスタゾール	プレタール	3日前	
	イコサペント酸エチル	エバデール	7日前	
	オメガ-3脂肪酸エチル	ロトリガ	7日前	
	サルボグレラート	アンブラーグ	1日前	
	ベラプロスト	ドルナー/プロサイリン/ベラサスLA/ ケアロードLA	1日前	
	血管拡張薬	リマプロストアルファデクス	オパルモン/プロレナール	
ジラゼブ		コメリアン	2日前	
トラビジル		ロコルナール	2日前	
ジピリダモール		ペルサンチン/ペルサンチンL	2日前	
脳循環改善薬	イフェンプロジル	セロクラール	2日前	休薬なし
	イブジラスト	ケタス	2日前	
	ニセルゴリン	サアミオン	2日前	
経口血糖降下薬	ビグアナイド薬	メトホルミン/メトグルコ/グリコラン/配合剤/ ジベトス/ジベトン	休薬なし	休薬なし
	SGLT2阻害薬	スーグラ/フォシーガ/ルセフィ/アプルウェイ/ デベルザ/カナグル/ジャディアンス/配合剤		
	それ以外			
骨粗鬆症薬	ラロキシフェン	エビスタ	休薬なし	休薬なし
	バゼドキシフェン	ビビアント		
女性ホルモン系薬	エチニルエストラジオール・ドロスピレノン	ヤーズ/ヤーズフレックス	休薬なし	休薬なし
	エチニルエストラジオール・レボノルゲストレル	ジェミニーナ		
	エチニルエストラジオール・ノルエチステロン	ルナベル/シンフェーズ/フリウエル		
	低用量ピル	アンジュ/トリキュラー/ラベルフィーユ		
		マーベロン/ファボワール		
	エチニルエストラジオール・ノルゲストレル	プラノバル		
	結合エストロゲン	プレマリン		
メドロキシプロゲステロン	ヒスロンH			

休薬期間は手術日を含まない日数になります

記載のある休薬期間はあくまで目安です。主治医の指示がある場合はこの限りではありません

手術当日の内服指示は必ず主治医に確認をお願いします

2021年10月作成 信州上田医療センター薬剤部 腎臓内科