

「形成外科」術前に休薬を考慮すべき内服薬

	一般名	代表的な商品名	休薬期間	
抗凝固薬	リバーロキサバン	イグザレルト	1日前	
	エドキサバン	リクシアナ	1日前	
	アピキサバン	エリキュース	2日前	
	ダビガトラン	プラザキサ	2日前	
	ワルファリン	ワーファリン	5日前	
抗血小板薬	アスピリン	バイアスピリン/バファリンA81	7日前	
	アスピリン/ランソプラゾール	タケルダ	7日前	
	アスピリン/ボノプラザン（タケキャブ）	キャブピリン	7日前	
	クロピドグレル	プラビックス	14日前	
	アスピリン/クロピドグレル	コンプラビン	14日前	
	プラスグレル	エフィエント	14日前	
	チクロピジン	パナルジン	14日前	
	チカグレロル	ブリリント	5日前	
	シロスタゾール	プレタール	3日前	
	イコサペント酸エチル	エバデール	7日前	
	オメガ-3脂肪酸エチル	ロトリガ	7日前	
	サルボグレラート	アンブラーグ	1日前	
	ベラプロスト	ドルナー/プロサイリン/ベラサスLA/ ケアロードLA	1日前	
血管拡張薬	リマプロストアルファデクス	オパルモン/プロレナール	休薬なし ^{※1}	
	ジラゼブ	コメリアン		
	トラピジル	ロコルナール		
	ジピリダモール	ペルサンチン/ペルサンチンL		
脳循環改善薬	イフェンプロジル	セロクラール	休薬なし ^{※1}	
	イブジラスト	ケタス		
	ニセルゴリン	サアミオン		
経口血糖降下薬	ビグアナイド薬	メトホルミン/メトグルコ/グリコラン/配合剤/ ジベトス/ジベトン	休薬なし	
	SGLT2阻害薬	スーグラ/フォシーガ/ルセフィ/アブルウェイ/ デベルザ/カナグル/ジャディアンス/配合剤		
	それ以外			
骨粗鬆症薬	ラロキシフェン	エビスタ	休薬なし	
	バゼドキシフェン	ビビアント		
女性ホルモン系薬	エチニルエストラジオール・ドロスピレノン	ヤーズ/ヤーズフレックス	休薬なし	
	エチニルエストラジオール・レボノルゲストレル	ジェミニーナ		
	エチニルエストラジオール・ノルエチステロン	ルナベル/シンフェーズ/フリウエル		
	低用量ピル	アンジュ/トリキュラー/ラベルフィーユ		休薬なし
		マーベロン/ファボワール		
	エチニルエストラジオール・ノルゲストレル	プラノバル		
	結合エストロゲン	プレマリン		
メドロキシプロゲステロン	ヒスロンH			

休薬期間は手術日を含まない日数になります

記載のある休薬期間はあくまで目安です。主治医の指示がある場合はこの限りではありません

※1：大規模手術の場合は休薬することもある（その際は別途指示あり）

手術当日の内服指示は必ず主治医に確認をお願いします

2021年11月更新 信州上田医療センター薬剤部 形成外科