

≪呼吸器内科≫気管支内視鏡前に休薬を考慮すべき内服薬

	一般名	代表的な商品名	休薬期間(出血高危険度)
抗凝固薬	リバーロキサバン	イグザレルト	1日前
	エドキサバン	リクシアナ	1日前
	アピキサバン	エリキュース	2日前
	ダビガトラン	プラザキサ	2日前
	ワルファリン	ワーファリン	5日前
抗血小板薬	アスピリン	バイアスピリン/バファリンA81	7日前
	アスピリン/ランソプラゾール	タケルダ	7日前
	アスピリン/ポノプラザン(タケキャブ)	キャブピリン	7日前
	クロピドグレル	プラビックス	14日前
	アスピリン/クロピドグレル	コンプラビン	14日前
	プラスグレル	エフィエント	14日前
	チクロピジン	パナルジン	14日前
	チカグレロル	ブリリント	5日前
	シロスタゾール	プレタール	3日前
	イコサペント酸エチル	エパデール	7日前
	オメガ-3脂肪酸エチル	ロトリガ	7日前
	サルポグレラート	アンプラーグ	1日前
	ベラプロスト	ドルナー/プロサイリン/ベラサスLA/ ケアロードLA	1日前
	血管拡張薬	リマプロストアルファデクス	オパルモン/プロレナール
ジラゼブ		コメリアン	1日前
トラピジル		ロコルナール	1日前
ジピリダモール		ペルサンチン/ペルサンチンL	1日前
血糖降下薬	ビグアナイド薬	メトホルミン/メトグルコ/グリコラン/配合剤/ジベトス/ジベトン	当日中止 ※指示が無い場合薬剤師から中止指示
	SGLT2阻害薬	スーグラ/フォシーガ/ルセフィ/アプル ウェイ/デベルザ/カナグル/ ジャディアンス/配合剤	
	それ以外	その他の経口血糖降下薬/注射製剤	
<p>※出血危険度について：気管支鏡検査におけるいずれの手技においても、 出血による重篤化な合併症のリスクが高いとの考えにより、出血高危険度とする</p>			

休薬期間は手術日を含まない日数になります

記載のある休薬期間はあくまで目安です。主治医の指示がある場合はこの限りではありません

2剤以上内服している場合は必ず医師の指示をカルテ上で確認してください

検査当日の内服指示は必ず主治医に確認をお願いします

※血糖降下薬については医師から特別の休薬指示が無い場合、休薬基準に従い薬剤師が中止指示をだします

2021年8月作成 10月更新 信州上田医療センター呼吸器内科・薬剤部